

## Proalvéolie supérieure

### ◆ Définition :

Anomalie alvéolaire du sens antéro-postérieur, localisée aux incisives supérieures, et caractérisée par une inclinaison vestibulaire exagérée de celles-ci

Il s'agit d'une malformation dento-alvéolaire avec ou sans diastèmes inter-incisifs

Pouvant produire une prochéilie : (grec = pro : en avant et Anomalie qui désigne la malformation se caractérisant par une position avancée d'une lèvre.



*A droite* : supra clusie incisive et proalvéolie supérieure exagérée

*A gauche* : vue palatine de la trace laissée par les bords libres des incisives inférieures au niveau de la muqueuse palatine du fait de l'anomalie occlusale



◆ **Formes cliniques :**

\_ La proalvéolie peut être symétrique, asymétrique.

\_ Comme elle peut être accompagnée de diastèmes inter-incisifs ou non.

*En haut :* proalvéolie supérieure sans diastèmes inter-incisifs

*En bas :* proalvéolie supérieure avec diastèmes inter-incisifs

*Remarque :* on peut aussi rencontrer une proalvéolie bi maxillaire dite biproalvéolie (à droite) ou la proalvéolie supérieure associée à la rétroalvéolie inférieure (à gauche).



*Anomalies associées :* cette anomalie peut être isolée (d'origine fonctionnelle) ou associée à d'autres anomalies alvéolaires (béance antérieure ou supraclusion) ou basale. Elle se retrouve dans les cas de classe II division 1.

